



دانشگاه علوم پزشکی شیراز

بیمارستان شهدای سلامت نی ریز

داروی آمیودارون

تهیه کننده: شهناز بنان (کارشناس پرستاری)

تاریخ تهیه: بهار 1401

تاریخ بازنگری: بهار 1404

تاییدکننده: دکتر داورال داوود متخصص قلب و عروق

منبع:

* داروهای ژنریک ایران

طبقه بندی دارویی: ضد اریتمی

اشکال دارویی:

* قرص 200 میلی گرم

* امپول 150 میلی گرم / 3 میلی لیتر

موارد مصرف:

در درمان تاکی کاردی بطنی و غیر پایدار از نظر همودینامیکی و فیبریلاسیون بطنی زمانی که سایر داروها موثر نباشند مصرف می شود. این دارو از راه تزریقی جهت تخفیف و پیشگیری از اریتمی فوق بطنی و 2 بطنی که به سایر دارو ها پاسخ نمی دهند، به ویژه هنگامی که همراه با سندرم ولف - پارکینسون وایت () باشد از جمله فیبریلاسیون دهلیزی، فلومتر دهلیزی، تاکی کاردی دهلیزی نابجا و تاکی کاردی فوق بطنی مصرف می شود. این دارو در اریتمی بطنی مثل تاکی کاردی بطنی نیز مورد مصرف دارد.

فارموکوشیک:

جذب امیودارون از راه خوراکی کند و متغیر است. حدود 20 تا 25 درصد از راه خوراکی جذب می شود سرعت دستابی به غلظت پلاسمایی یکنواخت و درمانی دارو، کند و دفع دارو طولانی است. متابولیسم این دارو کبدی است و نیمه عمر آن در مرحله ابتدایی 2/5 تا 10 روز و در مرحله انتهایی 26 تا 107 روز است. اثر دارو 2 تا 3 روز 3-2 ماه پس از مصرف شروع می شود و حداکثر غلظت پلاسمایی نیز 3 تا 7 ساعت پس از مصرف حاصل می شود.

منبع مصرف:

در انسداد دهلیزی - بطنی درجه 2 یا 3 که از قبل وجود داشته است (بدون ضربان ساز مصنوعی) حملات برادی کاردی که منجر سنکوب می شود در عیب عملکرد گروه سینوسی

و حساسیت شدید به دارو نباید استفاده شود. لازم به ذکر است که این عوارض ضرورتاً در همه افراد دیده نمی شود و در صورت توصیه به مصرف نباید از عوارض آن ترس داشت.

عوارض:

اختلال در بینایی
برادی کاردی (کاهش ضربان قلب)
حساسیت به نور و به ندرت تغییرات رنگ پوست
کم کاری تیروئید
پر کاری تیروئید
هیپاتیت
تهوع و استفراغ
احساس طعم فلز در دهان
لرزش
سر گیجه و سر درد
بی خوابی
ثورات جلدی

التهاب عروق
کاهش پلاکت خون
تنگی نفس
هشدار:

1. از مومن عملکرد کبد و تیروئید در درمان طولانی مدت ضروری است. امیدارون می تواند سبب بروز اختلال در عملکرد تیروئید شود.
2. در صورت بروز تنگی نفس یا پیشرفت آن و همچنین بروز سرفه در بیماری که امیدارون مصرف می کند، احتمال وجود پنومونی باید در نظر گرفت.
3. در موارد زیر با احتیاط مصرف شود :
* نارسایی احتقانی قلب، عیب کار کلیه ، بیماران سالخورده ، برادی کاردی شدید
4. بعلت کند بودن شروع اثر دارو ، مشکل بودن تنظیم مقدار مصرف و احتمال بروز عوارض جانبی شدید درمان با این دارو در بیمارستان

شروع شده و مقدار مصرف دارو برای هر بیمار باید جداگانه و بر اساس نیاز های بیمار – پاسخ بالینی صورت پذیرد

5. در طول درمان با این دارو تعیین غلظت سرمی SGOT-SGPT (تست های کبدی) ثبت نوار قلب ضروری است.



وبسایت : neyrizhp.sums.ac.ir
شماره تماس : ۵۲۸۳۰۱۱۰۳
پورتال : ۵۲۸۳۰۱۱۶

با استفاده از نرم افزار بارکد خوان از طریق تلفن همراه می توانید فایل متنی پمفلت را دانلود نمایید.