



دانشگاه علوم پزشکی شیراز  
بیمارستان شهدای سلامت نی ریز

## شکستن سنگ حالب از طریق مجرای ادرار



تهیه کننده: شهناز بنان  
کارشناس پرستاری

تاریخ تهیه: بهار 1401

تاریخ بازنگری بعدی: بهار 1404

منبع: داخلی و جراحی برونر و سودارث

تایید کننده: دکتر ظهیرالدین خواجه کریم الدینی متخصص کلیه و  
مجاری ادراری

## مراقبت در منزل

1- معمولاً برای چند روز آنتی بیوتیک خوراکی و مسکن تجویز می شود.



2- به بیمار توصیه می شود مایعات زیاد مصرف نماید.

3- همچنین بیمار می بایست جهت کمک به دفع خرده سنگها فعالیت نموده و حتماً در یک ظرف ادرار نماید تا در صورت دفع سنگ آنها را جهت انجام آزمایش جمع آوری نماید.

4- بیمار ممکن است تا چند روز دفع ادرار خون آلود داشته باشد که با خوردن مایعات زیاد برطرف می شود.

5- در صورت تب و لرز یا درد شدید پهلو بیمار می بایست با پزشک خود تماس بگیرد.

6- معمولاً دو هفته بعد ، بیمار طبق دستور پزشک، با یک عکس ساده جهت کنترل مراجعه می نماید.

## بعد از جراحی:

در صورتی که سوند بیمار بطور کامل خارج شده باشد ، بیمار بعد از رفع بیحسی می تواند در همان روز مرخص شده ولی در مواردیکه نیاز به گذاشتن لوله حالب وجود دارد ، بیمار معمولاً 1 تا 2 روز در بیمارستان اقامت داشته و بعد از خارج کردن لوله حالب مرخص می شود.

ابزار مخصوص سنگ را خرد نموده و در این مرحله در صورتی که امکان داشته باشد خرده های سنگ خارج شده و در غیر این صورت بسته به نظر جراح ممکن است در داخل لوله حالب لوله ای قرار داده شود که توسط یک سوند مثانه ثابت می گردد.




### قبل از عمل:

متخصص بیهوشی قبل از عمل بیمار را مشاوره می نماید .  
آسپرین و سایر داروهای ضد التهاب از چند روز قبل می بایست قطع شوند . بیمار می تواند صبح روز عمل ناشتا به بیمارستان مراجعه نماید.

ولی معمولاً روز قبل بستری شده و از شب قبل ناشتا بوده و سرم تزریقی و آنتی بیوتیک شروع می شود.  
برای این عمل از روش بیحسی نخاعی استفاده می شود و در اغلب موارد نیاز به بیهوشی عمومی نیست.

### عمل جراحی:

جراح به کمک وسیله ای بنام یورتروسکوپ از طریق مجرای ادرار وارد مثانه و سپس لوله حالب شده و بعد از دیدن سنگ به کمک



### نمونه سنگهای دستگاه ادراری

### قولنج کلیه:

قولنج کلیه یک بیماری با درد شدید پهلو بوده که بعلت گیر کردن سنگ ادراری در لوله حالب و به دنبال آن انسداد و تورم کلیه می باشد . در اکثر موارد سنگ های کوچک حالب با تجویز مسکن خودبخود دفع می شوند ولی در مواردی که سنگها از راه TUL بزرگتر باشند ، می توان از روش جراحی مجرا، بدون هیچگونه برشی بر شکم و بی هیچ دردی سنگ را خارج نمود.



وب سایت : [neyrizahp.sums.ac.ir](http://neyrizahp.sums.ac.ir)  
شماره تماس : ۵۳۴۳۱۱۰۴  
پورتال : ۵۳۴۳۱۱۶

با استفاده از نرم افزار بارکد خوان از طریق تلفن همراه می توانید فایل متنی پمفلت را دانلود نمایید.