

- در صورتی که کودک استفراغ داشت تغذیه را متوقف و در صورت اجازه مجدد پزشک تغذیه را ادامه دهید.

مراقبت

- از دستکاری سرم ها و رابطهای متصل به کودک خودداری کنید.

- داروها طبق تجویز پزشک و در فواصل مشخص توسط پرستار برای کودک شما اجرا خواهد شد.

- با تیم مراقبتی در زمان انجام اقدامات تشخیصی و درمانی همکاری نمایید.

- مواظب باشید در زمان خواب و استراحت برانول یا لوله سرم از دست کودک شما خارج نشود.

ممکن است روزانه از کودک شما خون گیری شود.

- از دادن خودسرانه داروها و بدون اجازه پزشک به کودک خودداری نمایید.

- لوله معده کودک در صورت اجازه پزشک و قبل از ترخیص خارج خواهد شد.

- کودک شما حداقل تا 48 ساعت در بیمارستان بستری و از نظر تنفسی تحت نظر می باشد.



دانشگاه علوم پزشکی فارس

بیمارستان شهدای سلامت نی ریز

مسمومیت با اپیوم در اطفال

تهیه کننده: شهناز بنان

تاریخ تهیه: بهار 1401

تاریخ بازنگری: بهار 1404

تایید کننده: خانم دکتر زهرا سعادت متخصص اطفال

منبع: کودکان نلسون

برونر و سودارث 2014

- عدم تغذیه کودک از طریق دهان و ناشتا کردن آن به هیچ عنوان از راه دهان به کودک چیزی داده نشود چون احتمال دارد با استفراغ کردن کودک به ریه وی برگردد و موجب خفگی وی شود.

- برقراری راه وریدی و شروع مایعات وریدی گرفتن

- نمونه خون وریدی و یا شریانی و نمونه ادرار

- دادن اکسیژن با ماسک و یا لوله بینی

- جاگذاری لوله بینی معده‌ای

- تزریق پادزهر متادون

- کنترل دفع و جذب مایعات

رژیم غذایی

- در صورت اجازه پزشک بعد از هوشیاری کامل می‌توانید به کودک خود غذا بدهید .

- در صورت استفراغ و کاهش تعداد تنفس و یا کاهش سطح هوشیاری پرستار را آگاه کنید.

توصیه‌هایی برای والدین

- از نگهداری شربت متادون، حتی در دوزهای بسیار پایین، در شیشه‌های غیر دارویی (نظیر بطری نوشابه و...) و شیشه‌های بدون برچسب حاوی نام دارو اکیداً خودداری کنید.

- در صورت امکان، تحویل دوز مورد نیاز به صورت روزانه در مراکز ترک اعتیاد انجام پذیرد.

- شیشه‌های حاوی متادون می‌بایست دارای برچسب مخصوص هشدار دهنده حاوی نام فرآورده و توضیحات لازم مربوط به نحوه مصرف دارو باشند.

از آنجایی که طعم شربت متادون شیرین است و مصرف کنندگان دارو در برخی موارد آن را به همراه چای یا نوشابه مصرف می‌نمایند از نگهداری دارو در یخچال یا کنار سایر نوشیدنی‌ها خودداری گردد.

- دارو را دور از دسترس اطفال و در قفسه‌های قفل‌دار نگهداری نمایید.

- از مصرف دارو در زمان حضور کودک خودداری کنید.

- دارو را در ظرف‌هایی با درب مقاوم که کودک قادر به باز کردن آن نباشد نگهداری نمایید.

- به کودکانی که متوجه می‌شوند عوارض مصرف آن را بگویید.

- در شروع درمان و نیز در تمام طول دوره مصرف دارو، علائم مسمومیت با متادون را بدانید. از جمله این علائم می‌توان به اختلال هوشیاری، اختلالات تنفسی، نبض ضعیف، اختلالات گوارشی همچون تهوع و استفراغ و نیز سفتی و تکانه‌های عضلانی اشاره نمود.

زمان مراجعه بعدی

- در زمان مشاهده علائم مسمومیت با متادون سریعاً به پزشک مراجعه نمایید.

- در زمان مشخص شده توسط پزشک جهت پی‌گیری درمان مراجعه نمایید.



وبسایت : neyritshp.sums.ac.ir
شماره تماس : ۵۲۳۰۱۱۰۴
پورنگار : ۵۲۳۰۱۱۶

با استفاده از نرم‌افزار بارکد خوان از طریق تلفن همراه می‌توانید فایل متنی پمفلت را دانلود نمایید.