



دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بیمارستان شهدای سلامت نی ریز

نیترو گلیسرین

تهیه کننده: شهناز بنان

کارشناس پرستاری

تاریخ تهیه: بهار 1401

تاریخ بازنگری: بهار 1404

تایید کننده: آقای دکتر داور ال داوود متخصص قلب و عروق

عروق

منبع:

* دارو های فارماکولوژی (محمد آبگون)

* کتاب برونر سوارث

* سایت گوگل

قرص نیترو گلیسرین زیر زبانی

نیترو گلیسرین چیست؟

داروی نیترو گلیسرین برای کاهش درد انژین صدری ، گشاد کنند عروق و درمان کننده و درد قلبی تجویز می شود. انژین صدری، درد قفسه سینه ای است که مشخصا کمتر از 15 دقیقه طول می کشد و ناشی از خونرسانی ضعیف به ماهیچه قلب است.

در چه مواردی از قرص نیترو گلیسرین می توان استفاده کرد؟

- تخفیف درد قفسه سینه با مصرف دارو پس از شروع درد

- جلوگیری از حمله قلبی با مصرف دارو درست پس

از بروز حمله

- کاهش تعداد حملات با مصرف دائمی و منظم دارو

داروی نیترو گلیسرین با چه اشکالی موجود

می باشد؟

1- قرص های سفید رنگ 2- قرص های گرد و شفاف

و قرمز رنگ 3- اسپری 4- چسب نواری 5- پماد 6-

قرص زیر زبانی

نحوه مصرف قرص زیر زبانی در حمله قلبی:

اگر مشغول فعالیت هستید، بلافاصله استراحت کنید

و فعالیت خود را قطع نمایید. اولین قرص را در زیر

زبان قرار دهید. اگر درد ساکت نشد به فاصله 5 دقیقه

قرص دوم را استفاده کنید و اگر مجددا درد ساکت

نشد به فاصله 5 دقیقه دیگر قرص سوم را هم در زیر

زبان قرار دهید و به اولین مرکز درمانی مراجعه کنید.

توجه: در مدت 15 دقیقه نباید بیشتر از 3 قرص مصرف شود و اجازه دهید تا قرص ها بطور طبیعی در زیر زبان حل شوند و از خرد کردن و بلعیدن دارو **عوارض دارویی:**

سرگیجه، سردرد، افت فشار خون و افزایش ضربان قلب از عوارض شایع دارو می باشد و از عوارض غیر شایع بی خوابی، ضعف، تاری دید و تهوع می باشد. دیده نمی شود و در صورت توصیه به مصرف نباید از عوارض آن ترس داشت.

به خاطر داشته باشد که :

1. مصرف همزمان این دارو با سیلدنافیل، تادالافیل و وارونافیل ممنوع است زیرا باعث افت فشار خون شدید می شود.

2. کسانی که از این دارو استفاده می کنند، باید در هر مکان و شرایط این قرص را به همراه خود داشته باشند.

3. به هنگام استفاده از قرص زیر زبانی از خوردن، نوشیدن و سیگار کشیدن پرهیز کنید.

4. مصرف الکل باعث تشدید اثر دارو می شود و می تواند باعث افت فشار خون شود.

5. قبل از انجام فعالیت هایی که احتمال درد دارید از قرص استفاده کنید.

6. بعلت کاهش فشار خون باید بلافاصله بعد از قرص دراز کشید یا بنشینید.

7. به بیماری که قرص زیر زبانی مصرف می کند توصیه می شود به محض اینکه درد کاملا تسکین یافت هر مقدار قرص باقی مانده را که می تواند بیرون

بریزد. خصوصا اگر بیمار عارضه نا خوشایندی نظیر سردرد و سرگیجه را تجربه می کند.

8. قرص ها را سوراخ نکنید.

9. از تماس قرص های زیر زبان با فتاب خودداری کنید و در صورت تغییر رنگ مصرف نشود.

10. در قرص زیر زبانی پس از مصرف تلخی در زیر زبان احساس می شود که طبیعی است.



وب سایت : neyritshp.sums.ac.ir
شماره تماس : 0213-11102
مورنگار : 0213-11102

با استفاده از نرم افزار بارکد خوان از طریق تلفن همراه می توانید فایل متنی پمفلت را دانلود نمایید.